

Prospecto: información para el paciente

Engystol Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

Contenido del prospecto

1. Qué es Engystol Comprimidos y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Engystol Comprimidos
3. Cómo tomar Engystol Comprimidos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Engystol Comprimidos
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Engystol Comprimidos y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario antes de empezar a tomarlo y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Engystol Comprimidos

No tome Engystol Comprimidos

Si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento.

Si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento, se deberá consultar con su médico o farmacéutico..

Otros medicamentos y Engystol Comprimidos

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Engystol Comprimidos contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar Engystol Comprimidos

Vía oral.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Forma de administración:

Preferiblemente permitir que el comprimido se disuelva en la boca y después se trague.

Para los niños es posible aplastar el comprimido y agregarle una pequeña cantidad de agua.

Este medicamento debe tomarse separado de las comidas.

La dosis recomendada es:

Dosificación estándar:

Adultos y niños de 12 años o más: un comprimido 3 veces al día.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

Niños por debajo de 2 años: un comprimido una vez al día.

Niños entre 2-5 años: un comprimido 1-2 veces al día.

Niños entre 6-11 años: un comprimido 2 veces al día.

Dosificación aguda o inicial:

Adultos y niños de 12 años o más: un comprimido cada ½-1 hora, hasta un máximo de 12 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es:

Niños por debajo de 2 años: un comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 4 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Niños entre 2-5 años: un comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 6 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Niños entre 6-11 años: un comprimido cada 1-2 horas, hasta un máximo de 8 comprimidos al día, y después se continúa con la dosis estándar.

Si toma más Engystol Comprimidos del que debe, hable con su médico o farmacéutico y lleve este prospecto con usted. También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Si olvidó tomar Engystol Comprimidos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Engystol Comprimidos

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja o en la etiqueta después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 12 meses.

No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües, ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Engystol Comprimidos

Cada comprimido de 301,5 mg contiene:

- Los principios activos son Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.
- Los demás componentes (excipientes) son lactosa y estearato de magnesio.

Aspecto del producto y contenido del envase

Engystol Comprimidos son comprimidos redondos, planos, biselados de color blanco a blanco amarillento.

Engystol Comprimidos se presenta en caja de cartón conteniendo un envase de polipropileno con 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular de la autorización de comercialización:

Laboratorios Heel España, S.A.U.

Calle Madroño, s/n

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Teléfono: 918473910

Fax: 918463614

consulta@heel.es

Responsable de la fabricación:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Baden-Baden, Alemania

Fecha de la última revisión de este prospecto: 10/2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).