

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Bebegel 3830 mg/4,5 g gel retal glicerina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Bebegel e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Bebegel
3. Como utilizar Bebegel
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Bebegel
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Bebegel e para que é utilizado

Bebegel é um laxante utilizado para:

Obstipação.

Preparação do tubo digestivo para intervenções cirúrgicas e exames radiológicos do abdómen.

Situações em que seja necessário evitar esforços de defecação (hérnias).

Bebegel está também indicado nas grávidas e mães a amamentar para o tratamento da obstipação.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Bebegel

Não utilize Bebegel

- se tem alergia à glicerina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Os laxantes estão contraindicados em casos de náuseas, vômitos e dor abdominal a não ser por aconselhamento médico. As alterações dos hábitos intestinais que persistem mais do que duas semanas, devem ser avaliadas por um médico antes da utilização de laxantes. Se surgir hemorragia retal ou ausência de dejeção após utilização do laxante, deverá consultar o médico.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Bebegel.

O uso prolongado não é recomendado.

Não utilize Bebegel mais de 3 dias consecutivos, sem aconselhamento médico.

Outros medicamentos e Bebegel

Não estão descritas, até ao momento, interações com outros medicamentos.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Pode ser utilizado.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não se aplica.

3. Como utilizar Bebegel

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

Adultos e crianças com idade superior a 6 anos:

1 bisnaga por dia 5 a 30 minutos antes da hora pretendida para a defecação. A dose pode ser repetida na meia hora ou na hora seguinte, se a obstipação persistir.

Crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos:

1 bisnaga por dia 5 a 30 minutos antes da hora pretendida para a defecação.

Bebés (até aos 2 anos):

1 bisnaga por dia 5 a 30 minutos antes da hora pretendida para a defecação, até ao máximo de 3 dias consecutivos. Se necessária a continuação do tratamento, retomar somente após 24 horas.

Modo e via de administração

Uso retal.

Aplicar, de preferência, sempre à mesma hora para a normalização do intestino.

Retirar a tampa, apertar ligeiramente até sair o ar, introduzir a cânula no reto e apertar o conteúdo do tubo.

Antes de introduzir pode lubrificar a cânula com o próprio conteúdo do tubo.

Se utilizar mais Bebegel do que deveria

Não foi observado nenhum caso de sobredosagem. No entanto, no caso de ingestão acidental de Bebegel, aconselha-se que seja provocado o vômito e/ou lavagem gástrica, com acompanhamento médico. A ingestão de glicerina pode provocar cefaleias, alterações gástricas e diarreia.

Caso se tenha esquecido de utilizar Bebegel

Quando tal acontecer, deve recomeçar o tratamento logo que se lembrar e informar o seu médico do sucedido.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Pode sentir, associado à utilização do medicamento, desconforto retal, irritação, sensação de queimadura, cólica e tenesmo (sensação constante de peso no reto e desejo de evacuar).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Bebegel

Conservar a uma temperatura inferior a 30°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso nas cânulas ou na embalagem exterior, após “EXP”.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Bebegel

- A substância ativa é a glicerina.
- Os outros componentes são: gelatina e água purificada.

Qual o aspeto de Bebegel e conteúdo da embalagem

Geleia translúcida bastante fluída com cheiro característico.

Embalagem de 6 cânulas de 4,5 g.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Uriach Lusa, S.A.
Torre de Monsanto, Rua Afonso Praça, nº30,
4º Esq, Miraflores 1495-061 Algés

Fabricante

Sidefarma, Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.
Rua da Guiné, nº 26
2689-514 Prior Velho
Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em