

FOLHETO INFORMATIVO

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

ARNIGEL, gel

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar ARNIGEL, gel com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é ARNIGEL, gel e para que é utilizado
2. Antes de utilizar ARNIGEL, gel
3. Como utilizar ARNIGEL, gel
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar ARNIGEL, gel
6. Outras informações

1. O QUE É ARNIGEL, GEL E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento local de apoio em traumatologia benigna em ausência de feridas (contusões, fadiga muscular) nos adultos e crianças a partir de 1 ano.

2. ANTES DE UTILIZAR ARNIGEL, GEL

Não utilizar ARNIGEL, gel

Crianças com menos de um ano.

Se tem alergia às substâncias ativas ou qualquer outro componente de ARNIGEL, gel.

Não utilizar em mucosas, olhos, pele descamada, lesões infetadas ou feridas.

Ao utilizar ARNIGEL, gel com outros medicamentos

Associação desaconselhada com: Antivitaminas K.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

ARNIGEL, gel contém carbomer, solução de hidróxido de sódio 10%, etanol 96% v/v, água purificada.

Este medicamento contém 857 mg de etanol numa aplicação estimada de 4 g, o que é equivalente a 214 mg/g (21,4% p/p). Pode causar uma sensação de queimadura na pele danificada.

3. COMO UTILIZAR ARNIGEL, GEL

Uso cutâneo

Aplicar logo que possível uma camada fina de ARNIGEL, gel na região dolorosa com uma massagem ligeira até à sua completa penetração. Renovar aplicação 1 a 2 vezes ao dia.

Se utilizar ARNIGEL, gel mais do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de utilizar ARNIGEL, gel
Não utilize uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de utilizar.

Se parar de utilizar ARNIGEL, gel
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, ARNIGEL, gel pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Possibilidade de reação alérgica sendo necessária a suspensão do tratamento.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no [Apêndice V](#).

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. COMO CONSERVAR ARNIGEL, gel

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize ARNIGEL, gel após o prazo de validade impresso na caixa. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de ARNIGEL, gel

Para 100 g:

- A substância ativa é Arnica montana tintura mãe.....7 g
- Os outros componentes são: Carbomer, solução de hidróxido de sódio 10%, etanol 96% v/v, água purificada.

Qual o aspecto de ARNIGEL, gel e conteúdo da embalagem

Gel, bisnaga de 45 g ou de 120 g.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
França

Fabricante

BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
França

Este folheto foi aprovado pela última vez em