

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Strepsils Morango Sem Açúcar 1,2 mg + 0,6 mg Pastilhas
Álcool diclorobenzílico + Amilmetacresol

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Strepsils Morango Sem Açúcar e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
3. Como tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Strepsils Morango Sem Açúcar
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Strepsils Morango Sem Açúcar e para que é utilizado

Strepsils Morango Sem Açúcar apresenta-se na forma de pastilhas.

Strepsils Morango Sem Açúcar está indicado no tratamento sintomático da inflamação da boca e infeções da garganta, incluindo dor de garganta.

Strepsils pastilhas contém álcool diclorobenzílico e amilmetacresol que, pela sua ação desinfetante, aliviam os problemas da garganta e da boca, tendo uma ação calmante e suavizante da garganta irritada.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 3 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar

Não tome Strepsils Morango Sem Açúcar:

- se tem alergia (hipersensibilidade) às substâncias ativas ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- em crianças com menos de 6 anos, devido ao risco de asfixia.

Advertências e precauções

- se está grávida ou a amamentar.

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar.

Em caso de agravamento ou não melhoria do estado de saúde após 3 dias consulte o seu médico ou farmacêutico.

Outros medicamentos e Strepsils Morango Sem Açúcar

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não há conhecimento de interações medicamentosas.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não existem dados ou existem dados limitados relativamente à utilização de amilmetacresol e álcool diclorobenzílico na gravidez.

Como com todos os medicamentos, devem ser tomadas precauções na toma do medicamento durante a gravidez.

Desconhece-se se as substâncias ativas e seus metabolitos são excretados no leite materno, pelo que não pode ser excluído o risco para os lactentes.

Não estão disponíveis dados relativamente aos efeitos na fertilidade.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Strepsils Morango Sem Açúcar contém isomaltitol (E953) e maltitol líquido. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Pode ter efeito laxante moderado. O valor calórico do maltitol (isomaltitol) é de 2,3 kcal/g.

Este medicamento contém 7,30 mg de propilenoglicol em cada pastilha.

Este medicamento contém sódio. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por pastilha ou seja, é praticamente "isento de sódio".

Este medicamento contém fragrância com álcool benzílico. O álcool benzílico pode causar reações alérgicas.

3. Como tomar Strepsils Morango Sem Açúcar

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:

Adultos e crianças com mais de 6 anos de idade: dissolver 1 (uma) pastilha lentamente na boca cada 2 ou 3 horas conforme o necessário. Não tomar mais de 12 pastilhas num período de 24 horas.

Idosos: não é necessária redução da dose em idosos.

Crianças com menos de 6 anos de idade: não se recomenda a utilização em crianças com menos de 6 anos de idade.

Recomenda-se a toma deste medicamento por um período máximo de 3 dias.
Caso se tenha esquecido de tomar Strepsils Morango Sem Açúcar
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Poderão ocorrer ocasionalmente reações de hipersensibilidade (rash, angioedema, urticária, broncospasmo e hipotensão com síncope), dor abdominal, náuseas e desconforto oral (irritação da garganta, parestesias orais, edema da boca e glossodinia).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P, através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Strepsils Morango Sem Açúcar

Não conservar acima de 25°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Strepsils Morango Sem Açúcar

APROVADO EM 17-11-2023 INFARMED

- As substâncias ativas são: álcool diclorobenzílico e amilmetacresol. Cada pastilha contém 1,2 mg de álcool diclorobenzílico e 0,6 mg de amilmetacresol.
- Os outros componentes são: aroma de morango (contém propilenoglicol e álcool benzílico), sacarina sódica (E954), ácido tartárico, maltitol líquido, isomaltitol (E953) e antocianinas (E163).

Qual o aspeto de Strepsils Morango Sem Açúcar e conteúdo da embalagem
Strepsils Morango sem açúcar apresenta-se na forma de pastilha redonda de cor rosa, com um sabor característico a morango, acondicionada em blister de PVC-PVDC/Alumínio.

Embalagens com 8, 12, 16, 24 e 36 pastilhas.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Reckitt Benckiser Healthcare, Lda.
Rua D. Cristóvão da Gama, 1 - 1º C/D
1400-113 Lisboa

Fabricante

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
1, Thane Road
NG90 2DB Nottingham
Reino Unido

RB NL Brands B.V.
Schiphol Blvd 207,
1118 BH Schiphol,
Holanda

Este folheto foi revisto pela última vez em