

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Aero-OM 125 mg cápsula mole
simeticone

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto é necessário utilizar Aero-OM 125 mg com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos consulte o seu farmacêutico.
Em caso de persistência ou agravamento dos sintomas consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto informe o seu médico ou farmacêutico

Neste folheto:

O que é Aero-OM 125mg, e para que é utilizado
Antes de tomar Aero-OM 125 mg
Como tomar Aero-OM 125 mg
Efeitos secundários possíveis
Como conservar Aero-OM 125 mg
Outras informações

1. O que é Aero-OM 125 mg, e para que é utilizado

Aero-OM é um antiflatulento que atua reduzindo os gases que se acumulam no estômago e no intestino.

Qualquer que seja a sua proveniência, a retenção de gases no trato gastrointestinal faz-se sob a forma de bolhas gasosas que podem causar distensão abdominal e dores.

O simeticone modifica a tensão superficial das bolhas gasosas e reduz a flatulência.

2. Antes de tomar Aero-OM 125 mg

Não utilize Aero-OM 125 mg:

Se tem hipersensibilidade (alergia) ao simeticone ou a qualquer outro ingrediente de Aero-OM 125 mg.

Em casos suspeitos ou conhecidos de perfuração ou obstrução intestinal.

Tomar Aero-OM 125 mg com outros medicamentos:

Informe o seu farmacêutico se está a tomar, ou tomou recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e Aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Sem efeito.

3. Como tomar Aero-OM 125 mg,

Adultos e crianças com idade superior a 15 anos: 1 cápsula mole 4 vezes por dia, após as refeições.

As cápsulas moles devem ser engolidas inteiras e não mastigadas.

Não devem ser ingeridos mais de 500 mg (4 cápsulas) por dia.

Tome sempre o Aero-OM de acordo com as instruções do seu farmacêutico. Se tiver dúvidas esclareça-as com o seu farmacêutico.

Se tiver a sensação de que o efeito do Aero-OM é muito forte ou muito fraco, fale com o seu farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar Aero-OM:

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Consulte o seu farmacêutico sobre o que fazer.

Se parar de tomar Aero-OM

Não existem efeitos da interrupção do tratamento com Aero-OM.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, Aero-OM pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Estão descritos, embora que pouco frequentes:

- hipersensibilidade cutânea
- diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal

Em caso de aparecimento de um ou vários destes sintomas consulte o seu farmacêutico sobre o que fazer. Nunca pare o tratamento sem perguntar primeiro ao seu farmacêutico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu farmacêutico.

Comunique ao seu médico ou farmacêutico efeitos secundários detetados não constantes deste folheto.

5. Conservação de Aero-OM 125 mg

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não conservar acima de 25º C.

Não usar Aero-OM após o prazo de validade indicado na embalagem após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize se verificar deterioração do blíster.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente

6. Outras informações

A substância ativa do Aero-OM, é o simeticone. Cada cápsula mole contém 125mg de simeticone.

Os outros ingredientes são solução de anidrisorb, glicerol, gelatina e amarelo de quinolina (E 104).

Embalagens de 20 ou 60 cápsulas moles.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e fabricante:

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Medinfar Consumer Health - Produtos Farmacêuticos, Lda.
Rua Henrique Paiva Couceiro, 27, Venda Nova
2700-451 Amadora
Portugal

Fabricantes:

Catalent Germany Eberbach GmbH
Gammelbacher Strasse, 2 Eberbach - Baden
Alemanha

Corden Pharma Lisbon S.A.
R. da Indústria, N 2
2610 - 088 Amadora
Portugal

Laboratório Medinfar – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Rua Henrique de Paiva Couceiro, N 27
2700-451 Amadora
Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em: