

Folheto informativo: Informação para o doente

Euphon, 10 mg, pastilhas
Erisimo officinalis

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Euphon e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Euphon
3. Como tomar Euphon
4. Efeitos indesejáveis
5. Como conservar Euphon
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Euphon e para que é utilizado

Euphon está indicado nas seguintes situações:

- Tratamento sintomático da afonia, rouquidão e tosse irritativas.
- Afeções laríngeas.

Classificação farmacoterapêutica

5.2.3 – Aparelho Respiratório. Antitússicos e Expectorantes. Associações e medicamentos descongestionantes.

6.1.1 – Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na boca e orofaringe. De aplicação tópica.

Se não se sentir melhor ou se piorar após 5 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Euphon

Não tome Euphon

- Se tem alergia ao Erisimo officinalis ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Crianças com idade inferior a 6 anos (risco de engolir as pastilhas).
- Devido à presença de sacarose, glucose e açúcar invertido, este medicamento está contraindicado no caso de intolerância à frutose, de síndrome de má absorção de glucose e galactose ou de insuficiência em sacarose-isomaltase.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Euphon.

Se for diabético deve ter em conta que cada pastilha contém cerca de 0,6 g de açúcar.

No caso de persistência dos sintomas para além de 5 dias e/ou febre associada, a situação deverá ser reavaliada.

Crianças e adolescentes

Nos lactentes e crianças até 6 anos está contraindicado.

Nas crianças mais velhas e idosos não estão descritos quaisquer efeitos nefastos.

Outros medicamentos e Euphon

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não estão descritas interações com outros medicamentos.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não estão descritas malformações nem efeitos tóxicos sobre o feto. No entanto, como medida de precaução, é preferível não utilizar na gravidez.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não estão descritos efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Euphon contém sacarose, glucose e açúcar invertido. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Euphon contém Vermelho cochonilha A (E124). Pode causar reações alérgicas.

3. Como tomar Euphon

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se tiver dúvidas.

A dose recomendada é:

Adultos: 10 a 12 pastilhas por dia.

Crianças a partir dos 6 anos: 5 a 6 pastilhas por dia.

Deixar dissolver na boca e engolir, quando necessário, não ultrapassando a posologia máxima diária, durante o tempo suficiente para sentir melhoras, até um máximo de 5 dias.

Se tomar mais Euphon do que deveria

Em princípio não se verifica sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar Euphon

Não tome uma dose para compensar a pastilha que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Euphon

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Devido à presença do vermelho de cochonilha pode haver o risco de reações alérgicas.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Euphon

Não conservar acima de 25°C.

Manter dentro da embalagem exterior para proteger da luz e da humidade.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na caixa de plástico e embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado

Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração nas pastilhas.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Euphon:

- A substância ativa é o extrato de Erysimum Officinalis (Erisimo Officinalis).
- Os outros excipientes são: essência de laranja, essência de tangerina, vermelho de cochonilha A (E124), açúcar invertido, glucose líquida, goma arábica e sacarose.

Qual o aspeto de Euphon e conteúdo da embalagem

Euphon apresenta-se em embalagens de 70 pastilhas. As pastilhas são semissólidas, de forma cónica, de cor avermelhadas e cobertas de açúcar.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado:

Jaba Recordati, S.A.
Av.Jacques Delors
Ed. Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark
2740-122 Porto Salvo
Portugal

Fabricante:

Laboratoires Mayoly Spindler
6, Avenue de L'Europe
BP51 78401 Chatou Cedex
França

Este folheto foi revisto pela última vez em: