

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Quinodermil AS 30 mg/g + 30 mg/g Pomada
Clioquinol + Ácido salicílico

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 14 dias (ou 5 dias em doentes pediátricos), tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Quinodermil AS e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Quinodermil AS
3. Como utilizar Quinodermil AS
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Quinodermil AS
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Quinodermil AS e para que é utilizado

Quinodermil AS é um medicamento antifúngico que está indicado no tratamento de:

- Micoses interdigitais
- Dermatite seborreica
- Hiperqueratoses, incluindo calos e calosidades

2. O que precisa de saber antes de utilizar Quinodermil AS

Não utilize Quinodermil AS:

- Se tem alergia ao ácido salicílico, ao clioquinol ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).
- Em crianças com idade inferior a 2 anos.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Quinodermil AS.

Este medicamento não está indicado no tratamento de dermatite das fraldas ou crosta láctea do recém-nascido.

Não aplicar se houver lesão aberta (ferida).

Os salicilatos são rapidamente absorvidos pela pele e estão descritos casos de intoxicação por estes fármacos após o seu uso excessivo, pelo que não é aconselhada a utilização por longos períodos, em grandes concentrações, em extensas áreas corporais e na pele inflamada ou com soluções de continuidade e em pensos oclusivos.

Pode ocorrer hipersensibilidade cruzada em indivíduos sensíveis aos compostos iodados ou a derivados das quinonas e hidroquinonas (como os antimaláricos).

Deve ser evitado o contacto com as mucosas.

Este medicamento pode provocar descoloração do cabelo e das unhas.

Podem ocorrer testes falsos positivos em testes urinários de fenilcetonúria e testes para avaliação da função tiróideia.

Outros medicamentos e Quinodermil AS

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não estão documentadas interações com outros medicamentos.

Diuréticos, inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e antagonistas da angiotensina II (AII):

A aplicação de salicilato (>3g/dia) pode diminuir a eficácia dos diuréticos assim como de outros medicamentos anti-hipertensores. Nalguns doentes com função renal diminuída (ex.: doentes desidratados ou idosos com comprometimento da função renal) a coadministração de um IECA ou AII e agentes inibidores da cicloxigenase pode ter como consequência a progressão da deterioração da função renal, incluindo a possibilidade de insuficiência renal aguda, que é normalmente reversível. A ocorrência destas interações deverá ser tida em consideração em doentes a fazer a aplicação de ácido salicílico, sobretudo se for em zonas extensas da pele e por tempo prolongado, em associação com IECA ou AII. Consequentemente, esta associação medicamentosa deverá ser utilizada com precaução, sobretudo em doentes idosos. Os doentes devem ser adequadamente hidratados e deverá ser analisada a necessidade de monitorizar a função renal após o início da terapêutica concomitante, e periodicamente desde então.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.

Dada a possibilidade de ocorrência de absorção sistémica de clioquinol e de ácido salicílico, este medicamento só deverá ser utilizado durante a gravidez ou aleitamento por indicação médica expressa.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não se aplica.

Quinodermil AS contém para-hidroxibenzoato de metilo, para-hidroxibenzoato de propilo e lanolina anidra

O para-hidroxibenzoato de metilo e o para-hidroxibenzoato de propilo podem causar reações alérgicas (possivelmente retardadas).

A lanolina pode causar reações cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).

3. Como utilizar Quinodermil AS

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Aplicar três vezes por dia, até estabilização da situação, passando então a duas vezes por dia.

O tratamento não deve ter duração superior a 2 semanas, exceto em situações devidamente controladas pelo médico.

Utilização em crianças

Não está indicada a utilização em crianças com idade inferior a 2 anos. A utilização em crianças com idade de 2 ou mais anos não deve ser superior a 5 dias.

Se utilizar mais Quinodermil AS do que deveria
Não estão descritos casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de utilizar Quinodermil AS

Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Pode ocorrer irritação, ardor local e rash cutâneo.

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através de:

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Quinodermil AS

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não conservar acima de 25°C.

Conservar na embalagem de origem.

APROVADO EM
02-05-2024
INFARMED

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na bisnaga e na embalagem exterior após "EXP". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado

Não utilize este medicamento se verificar sinais visíveis de deterioração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Quinodermil AS

As substâncias ativas são o clioquinol e o ácido salicílico.

Os outros componentes são: vaselina branca, lanolina anidra, para-hidroxibenzoato de metilo e para-hidroxibenzoato de propilo.

Qual o aspeto de Quinodermil AS e conteúdo da embalagem

Quinodermil AS apresenta-se na forma farmacêutica de pomada, de cor acastanhada, acondicionada em bisnagas de alumínio.

Embalagem contendo 1 bisnaga com 25 gramas de pomada.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Av. 25 de Abril, 6-6A

2795-225 Linda-a-Velha

Portugal

Tel: +351 21 415 81 30

Fax: +351 21 415 81 31

E-mail: geral@edol.pt

Fabricantes

Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Av. 25 de Abril 6-6A, 2795-225 Linda-a-Velha - Portugal

Rua Quinta do Salrego 22-22A, Portela de Carnaxide, 2790-144 Carnaxide - Portugal

| Rua Casal do Canas 6-6A, 2790-204 Carnaxide - Portugal

Este folheto foi revisto pela última vez em {mês de AAAA}