

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Fenolip 20 mg/ ml solução para inalação por nebulização 15 ml
Cromoglicato dissódico

Leia atentamente este folheto antes de tomar o medicamento

- Conserve este Folheto Informativo. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso ainda tenha dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outras pessoas; o medicamento pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Fenolip, solução para inalação por nebulização e para que é utilizado
2. Antes de tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização
3. Como tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização
4. Efeitos secundários possíveis
- 5 Como conservar Fenolip, solução para inalação por nebulização
- 6.Outras informações

1. O QUE É FENOLIP, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO E PARA QUE É UTILIZADO

Fenolip, solução para inalação por nebulização é um medicamento utilizado no tratamento da rinite alérgica esporádica e da rinite alérgica sazonal (febre dos fenos).

O Fenolip, solução para inalação por nebulização, é um fármaco profilático usado na rinite alérgica e como tal a sua utilização não provoca um alívio sintomático imediato e por outro lado deverá ser continuada, mesmo após o desaparecimento dos sintomas, em situações em que os doentes estejam expostos ao alérgeno.

Grupo Farmacoterapêutico: 14.1.4 – Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas. Produtos para aplicação nasal. Fármacos profiláticos usados na rinite alérgica
Código ATC: R01AC01

2. ANTES DE TOMAR FENOLIP, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO

Não tome Fenolip, solução para inalação por nebulização

- Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa, cromoglicato dissódico ou a qualquer outro componente de Fenolip, solução para inalação por nebulização

Tome especial cuidado com Fenolip, solução para inalação por nebulização

Não aplicável

Ao tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Ao tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização com alimentos e bebidas
Não aplicável

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Embora não haja provas de efeitos embriotóxicos, evitar a utilização de Fenolip solução para inalação por nebulização durante os três primeiros meses de gravidez.

Não há estudos de utilização do Fenolip solução para inalação por nebulização por mães a amamentar pelo que a sua administração deve ser feita com precaução avaliando a relação risco benefício.

Em relação aos outros grupos não há referências.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não são conhecidas quaisquer limitações à condução de veículos ou uso de máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Fenolip, solução para inalação por nebulização

Não aplicável

3. COMO TOMAR FENOLIP, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO

Tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Salvo outra prescrição, a dose para adultos e crianças com mais de 4 anos é de 1 inalação de solução em cada narina, 4 vezes ao dia.

O tratamento com Fenolip, solução para inalação por nebulização, deverá ser continuado, mesmo após o desaparecimento dos sintomas, em situações em que os pacientes estejam expostos ao alérgeno (polén, pó, esporos de fungos, etc.)

Manter a embalagem na vertical. Introduzir a extremidade na narina e pressionar uma vez, o mecanismo de nebulização.

Se tomar mais Fenolip, solução para inalação por nebulização do que deveria
Não são de considerar casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização
Se for omitida a administração de uma ou mais doses o tratamento deve continuar.
Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar

Se parar de tomar Fenolip, solução para inalação por nebulização
Não é necessária qualquer precaução especial para a suspensão do tratamento.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Fenolip, solução para inalação por nebulização pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Em casos raros pode ocorrer uma moderada irritação da mucosa nasal.

Podem ser observadas reacções alérgicas em casos isolados. seguindo um tratamento com ácido cromoglicico/cromoglicato dissódico.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. COMO CONSERVAR FENOLIP, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO POR NEBULIZAÇÃO

Não conservar acima de 25° C.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Fenolip, solução para inalação por nebulização após o prazo de validade impresso na embalagem exterior.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Fenolip, solução para inalação por nebulização

- A substância activa é o Cromoglicato dissódico
- Os outros componentes são edetato dissódico, polissorbato 80, sorbitol, água para preparações injectáveis e hidróxido de sódio.

Qual o aspecto de Fenolip, solução para inalação por nebulização e conteúdo da embalagem

Frasco com 15 ml de solução para inalação por nebulização

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Angelini Farmacêutica, Lda
Rua João Chagas 53, Piso 3
1499-040 Cruz Quebrada - Dafundo
Portugal
Tel: 214148300
Fax: 214142981
E-mail: apoio.utente@angelini.pt

Fabricante

Dr. Gerhard Mann GmbH
Brunsbutteler Damm 165-173
13581 Berlim
Alemanha

Medicamento não sujeito a receita médica

Este folheto foi aprovado pela última vez em: